



ワクチン	種類	乳児期									幼児期				学童期／思春期									
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)	不活化			①	②	③						④ (注1)												
肺炎球菌 (PCV13)	不活化			①	②	③						④												(注2)
B型肝炎	ユニバーサル			①	②																			(注3)
	母子感染予防	①	②								③													
ロタウイルス	1価			①	②						(注4)													
	5価			①	②	③					(注5)													
4種混合 (DPT-IPV)	不活化			①	②							④ (注6)												(7.5歳まで)
3種混合 (DPT)	不活化			①	②							④ (注6)												(7.5歳まで)
2種混合 (DT)	不活化																							⑥11-12歳 (注8)
																								11歳 ① 12歳
ポリオ (IPV)	不活化			①	②							④ (注6)												(7.5歳まで)
																								⑤ (注9)
BCG	生											①												
麻疹・風疹混合 (MR)	生																							② (注10)
水痘	生																							(注11)
おたふくかぜ	生																							② (注12)
日本脳炎	不活化																							① ② ③ (7.5歳まで)
																								④9-12歳
インフルエンザ	不活化																							毎年 (10、11月などに) ①②
																								13歳より①
ヒトパピローマウイルス (HPV)	不活化																							(注13)
																								小6 中1 ①②③ (注14) 中2～高1

定期接種の推奨期間
 定期接種の接種可能な期間
 任意接種の推奨期間
 任意接種の接種可能な期間
 添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
 健康保険での接種時期